

Html/news/zhxw/Class1640/18104620070507224300.html.

[ 2 ] 管筱玲, 杨艳杰. 初发急性脑卒中患者生活质量的调查分析 [J]. 中国伤残医学, 2009, 17(2): 39-40.

[ 3 ] 莫锐钊, 蒋超. 脑卒中吞咽困难患者的康复护理进展 [J]. 护理学杂志, 2009, 24(15): 90-92.

[ 4 ] 王玉华, 高峰. 关于开展无缝护理的构想 [J]. 牡丹江医学院报, 1998, 19(2): 88-89.

[ 5 ] Giuse NB, Williams AM, Giuse DA. Integrating best evidence into patient care: a process facilitated by a seamless integration with informatics tools [J]. J Med Libr Assoc, 2010, 98(3): 220-222.

[ 6 ] 中华神经科学会, 中华神经外科学会. 各类脑血管疾病的诊断要点 [J]. 中华神经科杂志, 1996, 29(6): 379-380.

[ 7 ] 王拥军, 张婧. 脑血管病量表手册 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 37-46.

[ 8 ] 钱春荣. 脑卒中患者延续护理方案的建立和效果评价 [D]. 重庆: 第三军医大, 2011: 1-79.

[ 9 ] 谢兰兰. 自编早期康复操对脑卒中偏瘫患者运动功能恢复的应用研究 [D]. 河北医科大学, 2014: 1-63.

[ 10 ] 郑建琴, 穆艳红, 徐学军, 等. 脑血管病偏瘫患者健肢功能的维持 [J]. 解放军护理杂志, 1999, 16(2): 37-38.

[ 11 ] Leung SO, Chan CC, Shah S. Development of a Chinese version of the Modified Barthel Index-validity and reliability [J]. Clin Rehabil, 2007, 21(10): 912-922.

[ 12 ] Fugl-Meyer AR, Jääskö L, Leyman I. The post-stroke hemiplegic patient. 1. a method for evaluation of physical performance [J]. Scand J Rehabil Med, 1975, 7(1): 13-31.

[ 13 ] 吕探云, 孙玉梅. 健康评估 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 97.

[ 14 ] 代启燕. 脑卒中中偏瘫病人的早期康复护理 [J]. 全科护理, 2011, 9(5): 419-420.

[ 15 ] 马峥. 健康教育在脑卒中偏瘫患者早期康复中的影响分析 [J]. 国际护理学杂志, 2014, 33(4): 896-897.

[ 16 ] 王潞平, 田泽丽. 具体指导下的家庭康复治疗对脑卒中偏瘫病人疗效的影响 [J]. 中国物理医学与康复杂志, 2008, 30(10): 704-706.

[ 17 ] 李澍, 李瑾, 严军, 等. 社区脑卒中患者居家状况调查 [J]. 中国康复, 2006, 21(5): 357-358.

[ 18 ] 王成秀, 王桂荣, 杨飞翔. 脑卒中患者家庭护理需求调查与分析 [J]. 中国康复, 2006, 21(2): 129.

[ 19 ] Donnelly M, Power M, rusell M, et al. Randomized controlled trial of an early discharge rehabilitation service: the Belfast Community stroke Trial [J]. Stroke, 2004, 35(1): 127-133.

[ 20 ] Anderson C, Rubenaeh S, Mhurchu CN, et al. Home or hospital health cut comes at 6 months [J]. Stroke, 2000, 31(5): 1024-1031.

# 预防接种信息系统在儿童预防接种中的应用

杨贵云<sup>1</sup>, 郑超<sup>2</sup>, 陈颖<sup>1</sup>, 李滕<sup>3</sup>, 刘霞<sup>4</sup>

(1. 武汉市普爱医院常青花园社区卫生服务中心; 2. 华中科技大学管理学院, 武汉 430074; 3. 武汉市第十三医院, 武汉 430100; 4. 华中科技大学梨园医院, 武汉 430033)

**摘要:**目的 探讨社区卫生服务中心运用预防接种信息系统的管理对提高儿童预防接种率的作用。  
**方法** 2013年起,在武汉市普爱医院常青社区卫生服务中心建立预防接种管理路径,并依据路径开展接种前、接种中和接种后护理措施,以2012年全年接种数据为实施前,以2013年全年接种数据为实施后,在儿童预防接种信息系统中开展数据录入和延期接种儿童的筛查,并对其开展电话、电子邮件和上门随访宣教等方式的提醒。将护理管理、数据管理、随访提醒和健康教育等多种方法在社区预防接种工作中综合运用。  
**结果** 实施前后比较,1类疫苗接种率均有不同程度的提高,其中3项加强免疫剂次接种数据前后比较差异具有统计学意义( $P < 0.05$ )。  
**结论** 采用预防接种信息系统能及时了解社区儿童预防接种情况,综合管理能有效提高儿童的预防接种率。

**关键词:** 儿童; 预防接种; 信息系统

**中图分类号:** R473.72

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1009-8399(2015)04-0032-04

收稿日期: 2014-12-04

作者简介: 杨贵云(1978-),女,主管护师,硕士,主要从事临床护理。

通信作者: 刘霞(1978-),女,主管护师,本科,主要从事临床护理。

预防接种是大面积预防特定传染性疾病的一个重要途径,可以提高人群免疫水平,达到控制和最终消灭传染病的目的。国家计划免疫接种率越高,越能控制